

# iverlif L.A. Omega 3

Endectocida inyectable de Larga Acción



## Propiedades

La ivermectina es un excelente antiparasitario, eficaz contra parásitos internos y externos. El Aceite de Hígado de Bacalao, constituye un vehículo de origen ictiológico, caracterizado por poseer un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3, que cumplen importantes funciones metabólicas en el organismo para quien los consume en su dieta. Además por sus características oleosas, realiza una lenta liberación de la ivermectina, lo que produce el efecto de "Larga Acción" del producto.

## Composición

Cada ml contiene:

Ivermectina

10 mg

Aceite de Hígado de Bacalao c.s.

## Indicaciones

**iverlif L.A. omega 3** está indicado para el control de los siguientes parásitos:

### ENDOPARÁSITOS DE LOS BOVINOS:

#### Nematodos gastrointestinales

*Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas)

*Ostertagia lyrata* (adultos)

*Haemonchus placei*

*Mecistocirrus digitatus* (adultos)

*Trichostrongylus axei*

*Trichostrongylus colubriformis*

*Cooperia* spp

*Cooperia onchophora*

*Cooperia punctata*

*Cooperia pectinata* (adultos)

*Nematodirus helvetianus* (adultos)

*Nematodirus spathiger* (adultos)

*Strongyloides papillosus* (adultos)

*Toxocara vitulorum* (adultos)

*Bunostomum phlebotomum*



*Oesophagostomum radiatum*

### Parásitos Pulmonares

*Dictyocaulus viviparus* (adultos inmaduros y larvas inhibidas)

### ECTOPARÁSITOS DE LOS BOVINOS

*Dermatobia hominis* (nuche)

*Sarcoptes scabiei* var. *bovis*,

*Haematobia irritans*

Garrapatas del ganado: *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* y *Amblyomma cajennense*

Piojos

### ENDOPARÁSITOS DE LOS OVINOS

#### Nematodos gastrointestinales

*Ostertagia circumcincta*

*Ostertagia trifurcata*

*Haemonchus contortus*

*Trichostrongylus axei*

*Trichostrongylus colubriformis*

*Trichostrongylus vitrinus*

*Cooperia curticei*

*Nematodirus filicollis*

*Nematodirus spathiger*



NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

*Strongyloides papillosus*  
*Oesophagostomum columbianum*  
*Oesophagostomum venulosum*  
*Trichuris ovis*  
*Chabertia ovina*  
*Gaigeria pachyscelis*

## Presentación

Frascos x 100 y 500 ml.

### Parásitos Pulmonares.

*Dictyocaulus viviparus* (adultos inmaduros y larvas inhibidas)  
*Protostrongylus rufescens*

## Dosis y modo de empleo

**iverlif L.A. Omega 3** se administra en dosis de 1 ml por cada 50 Kg de peso vivo.

## Vía de administración

Intramuscular o subcutánea, (por esta última vía, administrar en la parte anterior o posterior de la paleta).

## Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

Puede ocurrir con el tiempo que el producto se enturbie, no es indicación de pérdida de actividad, en esos casos se recomienda AGITAR ANTES DE USAR

No dejar el frasco expuesto a la luz solar directa durante su uso.

## Tiempo de retiro:

Leche: no administrar a vacas en producción cuando la leche se destine al consumo humano.

Carne: 30 días.

## Registro Sanitario

Ecuador 3A1-B1-8471-AGROCALIDAD  
Guatemala 27-01-67-110,977



NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA